

Målgruppebeskrivelse ADHD

ICD-10:

Målgruppen omfatter patienter med primære lidelser inden for diagnoserne DF90.0 og DF98.8 (ikke ADHD-lignende symptomer som led i andre psykiske eller hjerneorganiske lidelser).

Målgruppen omfatter patienter med følgende symptomer:

- Patienten skal fra barnsben have haft betydelige og primære forstyrrelser af opmærksomhed og koncentration og hermed forbundne forstyrrelser i øvrige kognitive domæner
- Adfærdsmæssig impulsivitet, som ikke skyldes anden psykiatrisk eller neurologisk sygdom - herunder bipolar lidelse eller impulsive personlighedsforstyrrelser svarende til cluster B
- Hyperaktivitet eventuelt i form af indre uro/energiophobning
- Forstyrrelsen er vedvarende og præger individet på tværs af kontekstforhold

CGI \geq 5

Belastningsgrad \geq 5 (som følge af sygdommen)

MGA \geq 3

Hospitalspsykiatri

Symptomerne forårsager klinisk signifikant forringelse af sociale, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige områder af den nuværende funktion.

Patienter med mistænkt eller bekræftet psykisk lidelse inden for diagnoserne DF90.0 og DF98.8, hvor udredning og stabiliserende behandling vurderes at kunne få afgørende betydning for patientens fremtidige funktionsevne.

Praksis

Alle patienter bør i første omgang vurderes i almen praksis. Patienter med lettere til moderate ADHD-symptomer eller enkeltstående ADHD-symptomer behandles i primærsektoren.