

Målgruppebeskrivelse

AUTISME

ICD-10:

Målgruppen omfatter patienter inden for diagnoserne DF84.5/DF84.9 med følgende anamnese:

- Patienten skal siden den tidlige udviklingsperiode have haft betydelige kvalitative forstyrrelser af det sociale samspil og kommunikationsmønster samt et afgrænset, stereotypt og rigidt repertoire af interesser og aktiviteter
- Patienten er præget af høj grad af detaljeorienteret, systemisk tænkning og lav grad af kognitiv indlevelsessevne
- Forstyrrelsen er gennemgribende og præger individets udfoldelse i alle situationer

Nogle af disse patienter vil også opfylde face value diagnostiske kriterier for (DF60.1) skizoid eller (DF60.5) tvangspræget personlighedsstruktur eller andre personlighedsforstyrrelser, uden at disse kan anses for at være grundmorbus. Patienter med autisme som led i DF20-spektrumlidelse som grundmorbus eller (DF70-79) mental retardering er ikke målgruppe.

CGI \geq 5

Belastningsgrad \geq 5 (som følge af autismen)

MGA \geq 3

Hospitalspsykiatri

Symptomerne forårsager klinisk signifikant forringelse af sociale, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige områder af den nuværende funktion.

Patienter som ikke tidligere er diagnosticeret med autisme, hvor diagnostisk afklaring vurderes at kunne få afgørende betydning for allokering af relevant social støtte.

Praksis

Alle patienter bør i første omgang vurderes i almen praksis. Patienter med lettere til moderate autismespektrumlidelser eller enkeltstående autismesymptomer behandles i primærsektoren.